UPL Doing Things Better

PRITT®

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Pritt®

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRITT® es un formulado a base de imidacloprid, con actividad insecticida por vía sistémica (actúa por contacto e ingestión) y residual. Es absorbido tanto por vía radical (suelo), foliar y en el tratamiento de semillas. Resulta efectivo en el control de mosca blanca, mosquito verde, pulgones, gusano cabezudo, psíllidos, cicadelidos, minadores de hojas y taladros entre otros.

Nº DE REGISTRO:

24.573.

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 20% (SL) P/V.

FORMULACIÓN:

Concentrado soluble (SL).

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 y 5 L.

MODO DE ACCIÓN

Información técnica

MATERIA ACTIVA Y MODO DE ACCIÓN	VENTAJAS DE **PRITT®**
Los insectos tratados muestran inmediatamente los síntomas de envenenamiento con excitación y parálisis. Muestra actividad antialimentaria paralizando la acción de alimentarse de los insectos. Esta acción evita inmediatamente la transmisión de virus y controla el daño producido por los insectos. También tiene efectos repelentes sobre los adultos de las mosquitas blancas impidiendo la puesta de huevos. También es eficaz en el tratamiento de semillas, siendo rápidamente absorbido por la semilla desde la germinación y, después, por las raíces y por el hipocotilo. Es transportado por la savia bruta y distribuido por las hojas conforme va desarrollándose la planta.	**PRITT®** presenta un amplio espectro de acción, excelentes propiedades sistémicas y una elevada actividad residual. Está especialmente indicado contra determinadas plagas resistentes a insecticidas convencionales. **PRITT®** es un insecticida sistémico, lo que permite que el tratamiento este eficaz incluso en situación de plaga localizada por debajo de las hojas, y no alcanzado por la pulverización. • Actúa tanto por contacto como por ingestión. • Se puede usar por vía foliar, al suelo (radicular.

UPL Iberia S.A. · Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona · Tel. 932 405 000 - Fax 932 005 648 · www.uplonline.com
Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada

UPL Doing Things Better

PITT®

MODO DE EMPLEO

CULTIVO Y BENEFICIO	MODO DE EMPLEO	Dosis	P.S.	L.M.R.
Albaricoquero: Gusano cabezudo, minadores de hojas, mosquito verde, pulgones.	Aplicar únicamente después de la floración.	0,05-0,075% Cerezo: 0,05%	15	0,5
Castaño de Indias: minador.			N.P.	-
Cerezo: Gusano cabezudo, mosquito verde, orugas minadoras, tigre del cerezo.			15	0,5
Melocotonero y nectarino: Gusano cabezudo, minadores de hoja, mosquito verde, pulgones, tropinota.				
Frutales de pepita: Minadores de hojas, psilidos, pulgones.	Aplicar en pulverización normal, con un máximo de dos aplicaciones con intervalo de 10-15 días, al inicio del ataque de los pulgones.	0,05-0,075%	15	
Cítricos: Mosca blanca, fillocnistis, pulgones.	Aplicar en pulverización normal solo después de la floración. No aplicar en pulverización en el periodo comprendido entre el 1º de abril y 1º de julio a fin de no perjudicar al artrópodo útil Rodolia cardinalis. No tratar en parcelas con presencia de cochinilla acanalada. Para Phyllocnistis: Además de las especificaciones anteriores. Aplicar a dosis de 0,05%. Sin diluir, aplicar en el tronco o chapa de injerto mediante el equipo adecuado a la dosis de 1 cc/árbol (plantón e injerto de 1 año), 2 cc/árbol (plantón e injerto de 2 años) y 3 cc/árbol (plantón e injerto de 3 años).	Mosca blanca: 0,075% Fillocnistis: 0,05% Pulgones: 0,05-0,075%	30	1
Brécol: mosca blanca, pulgones.	Género Brasica: En pulverización no pasar de 0,5 l/Ha. En agua de riego por goteo a 0,5 l/Ha., máximo 2 aplicaciones por campaña.	Mosca blanca: 0,075% Pulgones: 0,05-0,075%	14	0,5
Coliflor: mosca blanca, pulgones.				
Repollo: mosca blanca, pulgones.			28	

UPL Iberia S.A. · Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona · Tel. 932 405 000 - Fax 932 005 648 · www.uplonline.com

Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada

Cucurbitáceas: mosca blanca, pulgones.	Sólo en cultivos de invernadero. También en agua de riego a 500-700 cc./Ha.	Mosca blanca: 0,075% Pulgones: 0,05-0,075%	3	0,2-1
Judías verdes: mosca blanca, pulgones.	Sólo en invernadero. También en agua de riego a 500-700 cc./Ha.	Mosca blanca: 0,075% Pulgones: 0,05-0,075%	3	2
Lechuga: mosca blanca, pulgones.	En pulverización foliar efectuar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. También se puede tratar mediante el agua de riego a la dosis de 500-700 cc./Ha. en una única aplicación alrededor del trasplante.	Mosca blanca: 0,075% Pulgones: 0,05-0,075%	7	
Pimiento y tomate: mosca blanca, pulgones.	También en agua de riego a 500-700 cc./Ha.	Mosca blanca: 0,075% Pulgones: 0,05-0,075%	7	Tomate: 0,5 Pimiento: 1
Palmáceas ornamentales: Taladros.	Aplicar en pulverización normal al cogollo y estípite de la planta, (previa eliminación de las inflorescencias para ajustarse al Reglamento UE 485/2013) a la dosis indicada o en el caso de palmáceas en vivero aplicar mediante el riego por goteo a una dosis de 8-10 l/Ha. de producto, con un máximo de dos aplicaciones espaciadas 30-40 días. Mediante inyección al tronco, cada 45-55 días de marzo a noviembre, con una dosis de 4-10 ml/aplicación a 1,5-2 m. de la corona de hojas. La aplicación se efectuará por empresas especializadas, pudiéndose aplicar en el ámbito de parques y jardines.	0,05-0,075%	N.P.	-
Ornamentales herbáceas y leñosas: mosca blanca, pulgones.	Sólo en cultivos de invernadero.	Mosca blanca: 0,075% Pulgones: 0,05-0,075%	N.P.	-

P.S.: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados.
N.P.: No Procede.

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

UPL Iberia S.A. · Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona · Tel. 932 405 000 - Fax 932 005 648 · www.uplonline.com
Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada

CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES:

Consultar con el servicio técnico de **UPL Iberia** en caso de duda sobre mezclas. Aplicar en pulverización normal o mediante las técnicas autorizadas en los casos particulares que se relacionan en el apartado de 'Modo de empleo'.

Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros insecticidas con distinto tipo de acción.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

UPL Iberia S.A. · Av. Josep Tarradellas 20-30, 4º-7ª · 08029 Barcelona · Tel. 932 405 000 - Fax 932 005 648 · www.uplonline.com
Antes de utilizar el producto, leer atentamente las instrucciones de la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. ® Marca registrada